



161-49 Couderc

161-49 C

Aptitudes culturales:

- Portainjerto muy generalizado en España por su óptima adaptación a terrenos calizos y por tener una multiplicación fácil y barata.
- Es de vigor medio y proporciona al injerto una producción regular con un ligero adelanto en las fechas de maduración; este vigor más reducido con respecto a otros portainjertos, hace que el desarrollo inicial de las plantas sea más lento.
- Aunque en algunos casos se le ha citado como resistente a la sequía, luego se ha visto que no lo es tanto y que va bien en terrenos arcillosos frescos que no se desequen excesivamente.
- Su resistencia a la salinidad es nula.
- Es sensible a los nematodos (*Meloidogyne* sp.).
- Los campos de pies madres producen una gran cantidad de madera y enraíza muy bien; el injerto en campo prende bastante bien, pero no tanto el de taller.
- Es muy sensible a la tilosis y se citan muchos casos de formación en estas excrecencias, que impiden la circulación de la savia por los vasos leñosos, provocando una desecación y caída prematura de las hojas en el otoño.
- Un inconveniente importante de este patrón es su similitud morfológica al 5BB que presenta un grave problema con el injerto en campo, ya que la variedad se franquea con facilidad y han aparecido casos de incompatibilidad, además no está adaptado al área mediterránea, sino que es más propio de regiones más septentrionales. Por ello es importante asegurar la identidad varietal cuando se utiliza el 161-49C.



Ampelografía:

Sumidad:

Apertura *extremidad* Semiabierta

Pelos *postrados de la extremidad* Pigmentación media
Densidad media

Pámpano:


Color *entrenudo* Rojo en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Color *nudo* Rojo en la cara dorsal
Rojo en la cara ventral

Densidad *pelos tumbados* Nula-baja en el nudo
Baja en el entrenudo



161-49 Couderc



Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales Nula o muy débil

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja entre nervios
Baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Grande

Forma del limbo Deltoide

Número de lóbulos Tres

Disposición lóbulos del seno peciolar Medio abierto

Hinchazón del haz Débil

Perfil en sección transversal Plano

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad muy superficial con lóbulos abiertos

Pigmentación del haz Débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Nula o muy baja entre nervios

Densidad pelos erguidos sobre nervios principales Densa sobre nervios

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo entre más corto y ligeramente más corto que el nervio central, con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes rectilíneos-convexos, de longitud medios y con relación longitud-anchura pequeña-mediana

Hoja adulta:

Color Marrón amarillento

Relieve superficie Acuminado