



41 B Millardet y de Grasset

41 B

Aptitudes culturales:

- Es uno de los patrones clásicos en razón, sobre todo, a su gran capacidad de adaptación a suelos calizos, ya que se cita una tolerancia hasta el 40% en caliza activa, aunque estos umbrales pueden disminuir como consecuencia de un debilitamiento de la planta y un mal agostamiento otoñal que puede provocar el amarillamiento en primaveras muy húmedas.
- Tiene un vigor medio y su sistema radicular está formado por raíces gruesas poco numerosas y carnosas que llevan pocas raicillas, lo que explica la lentitud del primer crecimiento; una vez conseguido éste y bien anclado en el terreno induce una gran producción. Su ciclo vegetativo corto adelanta la maduración.
- Se muestra medianamente resistente a la sequía y en suelos con subsuelo húmedo sufre debilitamientos importantes.
- Su resistencia a la salinidad y a los nematodos (*Meloidogyne*) es nula.
- Los campos de pies madres producen poca madera que enraíza con dificultad, sobre todo si sufrió ataques de mildiu en hoja durante el período vegetativo anterior y no pudo tener un buen agostamiento. La afinidad es muy buena con todas las viníferas, teniendo un comportamiento más regular en el injerto en campo que en de taller.



Ampelografía:

Sumidad:



<i>Apertura extremidad</i>	Semiabierta-abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación débil Densidad alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en nudos Baja-media en entrenudos



41 B Millardet y de Grasset



Hoja joven:

Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales	Nula o muy débil-débil
Densidad pelos tumbados	Débil entre nervios Débil sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo	Medio
Forma del limbo	Deltoides
Número de lóbulos	Tres
Disposición lóbulos del seno peciolar	Medio abierto
Hinchazón del haz	Débil
Perfil en sección transversal	Forma de V
Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores	Profundidad muy superficial con lóbulos abiertos
Pigmentación del haz	Ausente o muy débil
Densidad pelos tumbados entre nervios principales	Nula o muy baja entre nervios del envés
Densidad pelos erguidos sobre nervios principales	Baja sobre nervios del envés
Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo	Peciolo más corto que el nervio central con densidad débil de pelos tumbados
Forma y longitud de dientes	Dientes con ambos lados convexos de longitud cortos y con relación longitud-anchura pequeña

Hoja adulta:

Color	Marrón oscuro
Relieve superficie	Anuloso-estriado